

## **CRITÈRES D'ADMISSIBILITÉ À L'ACCUEIL CLINIQUE :**

- Usager âgé de 16 ans ou plus apte à consentir aux soins (ou avec mandataire rapidement disponible)
- Usager référé par son médecin de famille ou par un médecin requérant qui assurera le suivi médical rapproché
- Usager ambulat ou nécessitant l'aide d'une seule personne
- Usager présentant les paramètres cliniques suivants :
  - Rythme cardiaque inférieur ou égal à 120/min
  - Rythme respiratoire inférieur ou égal à 30/min
  - Pression artérielle systolique supérieure à 90 mmHg ou inférieure à 200 mmHg
  - Pression artérielle diastolique inférieure à 120 mmHg
  - Température supérieure à 35°C ou inférieure ou égale à 38.5
  - SaO<sub>2</sub> supérieur ou égal à 90%
- Usager ne présentant pas une altération de l'état de conscience
- Usager ne présentant pas des étourdissements associés à des saignements actifs
- Usager non référé en psychiatrie ou en obstétrique ou femme enceinte

## **CRITÈRES D'EXCLUSIONS À L'APPLICATION DE CE PROTOCOLE:**

- Température B supérieure à 38.5° C
- Syndrome infectieux :
  - Diaphorèse intense
  - Frissons
- Anorexie
- Douleur intense non soulagée par analgésique
- Douleur prolongée pour plus de 12 heures
- Signes d'ictère