

## **CRITÈRES D'ADMISSIBILITÉ À L'ACCUEIL CLINIQUE :**

- Usager âgé 16 ans ou plus apte à consentir aux soins (ou avec mandataire rapidement disponible)
- Usager référé par son médecin de famille ou par un médecin requérant qui assurera le suivi médical rapproché
- Usager ambulant ou nécessitant l'aide d'une seule personne
- Usager présentant les paramètres cliniques suivants :
  - Rythme cardiaque inférieur ou égal à 120/min
  - Rythme respiratoire inférieur ou égal à 30/min
  - Pression artérielle systolique supérieure à 90 mmHg ou inférieure à 200 mmHg
  - Pression artérielle diastolique inférieure à 120 mmHg
  - Température supérieure à 35°C ou inférieure ou égale à 38.5
  - SaO<sub>2</sub> supérieur ou égal à 90%
- Usager ne présentant pas une altération de l'état de conscience
- Usager ne présentant pas des étourdissements associés à des saignements actifs
- Usager non référé en psychiatrie ou en obstétrique ou femme enceinte

## **CRITÈRES D'EXCLUSIONS À L'APPLICATION DE CE PROTOCOLE:**

En présence des signes et symptômes suivants, tout au long du processus, référer l'usager à l'urgence:

- Température B supérieure à 38.5 °C
- Douleur intense non soulagée par les analgésiques
- Douleur prolongée pour plus de 12 heures
- Méléna ou saignement
- Poids supérieur à 150 Kg
- Grossesse
- Troubles hépatiques
- Syndrome infectieux :
  - Diaphorèse intense
  - Frissons
- Symptômes d'embolie pulmonaire :
  - Douleur thoracique nouvelle
  - Dyspnée au repos
  - Progression de dyspnée connue