

CRITÈRES D'ADMISSIBILITÉ À L'ACCUEIL CLINIQUE :

- Usager âgé de 16 ans et plus apte à consentir aux soins (ou avec mandataire rapidement disponible)
- Usager ayant un médecin de famille et référé par lui sur une requête correctement complétée
- Usager ambulatoire ou nécessitant l'aide d'une seule personne
- Usager présentant les paramètres cliniques suivants :
 - Rythme cardiaque plus petit ou égal à 120 battements par minute
 - Rythme respiratoire plus petit ou égal à 30 par minute
 - Pression artérielle systolique plus grande que 90 mmHg ou plus petite que 200 mmHg
 - Pression artérielle diastolique plus petite que 120 mmHg
 - Température plus grande que 35°C ou plus petite ou égale à 38.5
 - SaO₂ plus grande ou égale à 90%
- Usager ne présentant pas une altération de l'état de conscience
- Usager ne présentant pas des étourdissements associés à des saignements actifs
- Usager non référé en psychiatrie ou en obstétrique ou femme enceinte

CRITÈRES D'EXCLUSIONS À L'APPLICATION DE CE PROTOCOLE:

En présence des signes et symptômes suivants, tout au long du processus, référer l'utilisateur à l'urgence:

- Hypotension orthostatique
- Douleur abdominale intense non soulagée par analgésique
- Résultat d'hémoglobine plus petit que 90 g/L
- Lipothymie
- Usager connu pour cirrhose
- Facteurs de co-morbidités multiples (insuffisance cardiaque sévère, MPOC sévère, mobilité réduite)
- Oligurie de 12 h et plus
- Température buccale plus grande ou égale à 38.5° C
- Plus de 2 hématomas en 12 h
- Plus de 2 mélénes en 12 h
- Méléna au toucher rectal