

ORDONNANCE COLLECTIVE



RÉACTION ALLERGIQUE ET PRURIT	OC-M-F2
Référence à un(e) : <input type="checkbox"/> Méthode de soins <input type="checkbox"/> Règle de soins Titre : _____	
Médication visée par l'ordonnance collective : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Benadryl / Diphenhydramine 	
Professionnels visés par l'ordonnance et secteur(s) d'activité(s) : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Infirmières exerçant en services courants au CSSS Vallée-de-la-Batiscan 	
Catégories de clientèle visées ou situation clinique visée : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Client présentant réaction allergique légère à modérée ▪ Client présentant piqûre d'insecte avec œdème et prurit local important 	
Activités réservées : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Évaluer la condition physique et mentale d'une personne symptomatique ▪ Exercer une surveillance clinique de la condition des personnes dont l'état de santé présente des risques, incluant le monitoring et les ajustements du plan thérapeutique infirmier ▪ Initier des mesures diagnostiques et thérapeutiques ▪ Administrer et ajuster des médicaments ou d'autres substances 	

INDICATIONS :

- Traitement de la réaction allergique **systemique**, légère à modérée.
- Soulagement de la réaction locale au site d'une piqûre d'insecte.

CONDITIONS :

- Réaction allergique légère à modérée : urticaire peu marqué, prurit oculaire, prurit et écoulement nasal.
- Piqûre(s) d'insecte(s) avec œdème et prurit local important au site de piqûre.

Adopté par le CMDP :	
	Rémi Grandisson, président du CMDP
Validé par la DSSOS-SI :	
	Chantal Carignan
Date d'entrée en vigueur : _____	Date de révision : <u>2014-02-12</u>

CONTRE-INDICATIONS :

- Hypersensibilité connue à ce médicament
- Grossesse
- Glaucome à angle fermé non contrôlé
- Maladies hépatiques graves : hépatite ou cirrhose décompensée
- Insuffisance rénale sévère
- Troubles de rétention urinaire significatifs

LIMITE / ORIENTATION VERS LE MÉDECIN :

- Réaction systémique plus importante telle que : œdème, éruptions urticariennes et prurit généralisés, troubles respiratoires et/ou circulatoires. En ce cas, faire voir immédiatement par un médecin.
- Appliquer, au besoin, l'ordonnance permanente « Traitement de l'anaphylaxie » - OC-M-F1.

INTERVENTIONS DE L'INFIRMIÈRE EN APPLICATION DE SON CHAMP D'EXERCICE ET DES ACTIVITÉS QUI LUI SONT RÉSERVÉES

Évaluer la condition physique et mentale d'une personne symptomatique

- S'assurer de l'absence d'une réaction systémique plus importante telle que : œdème, urticaire généralisée, prurit généralisé, trouble respiratoire et/ou circulatoire. Faire voir immédiatement par un médecin, le cas échéant.

Exercer une surveillance clinique de la condition des personnes dont l'état de santé présente des risques, incluant le monitoring et les ajustements du plan thérapeutique infirmier

- Surveiller les signes de réaction systémique progressive.

Initier des mesures diagnostiques et thérapeutiques

- Dans le cas de piqûres d'insectes :
 - Retirer le dard si présence visible.
 - Recommander l'application de glace sur la partie atteinte pendant 20 minutes/heure.
 - Recommander de voir le médecin dans les 48 heures, si progression ou pas de diminution de la réaction malgré l'utilisation régulière du Benadryl, car possibilité de surinfection bactérienne.
 - Recommander l'application d'un produit anti-moustique et le port de vêtements protecteurs appropriés aux activités.
- Dans les cas de réaction allergique, **aviser de consulter un médecin dans un délai maximal de 48 heures si persiste ou progresse.**

Administrarer et ajuster des médicaments ou d'autres substances

- Benadryl®, posologie :
 - Adultes et enfants > 12 ans : 50 mg
 - Clientèle adulte gériatrique : 25 mg
 - 6 à 12 ans : 25 mg
 - 2 à 5 ans : 6,25 mg
- Aviser les clients/parents des effets secondaires possibles : sécheresse de la bouche, vision trouble, étourdissement, somnolence ou excitation paradoxale.
- Mettre en garde contre la consommation d'autres déprimeurs du SNC (ex. : Graval®, autres antihistaminiques, sirop antitussif, etc.).